

Orme de Sibérie «*Ulmus pumila*»

Caduc / Bonsaï d'extérieur



Pour bien m'épanouir, j'ai besoin :



Taille

- Je suis un arbre vigoureux qui pousse rapidement et développe de nombreuses nouvelles pousses du printemps jusqu'à la fin de l'été.
- Vous pouvez effectuer une première taille au printemps, puis renouveler l'opération durant l'été selon ma croissance.
- Lorsque mes nouvelles pousses se sont suffisamment développées, réduisez-les à deux ou trois feuilles pour favoriser ma ramification.
- Ma taille de structure s'effectue de préférence en fin d'hiver, avant le redémarrage de la végétation.
- Supprimez les branches mal placées et les pousses inutiles pour conserver une silhouette harmonieuse.



Fertilisation

- J'ai besoin d'un engrais tous les 2 mois environ, du printemps jusqu'à l'automne.
- Dans ma pépinière je suis fertilisé avec un mélange organique et chimique universel type engrais à tomate (NPK 12 12 17).
- Vous pouvez alterner engrais chimique et organique (type fumier de cheval) pour m'apporter tous les nutriments dont j'ai besoin.

Pour plus d'informations, scannez ce QR Code pour accéder au guide complet sur notre blog :



Emplacement

- Je suis une espèce très rustique, originaire d'Asie, particulièrement résistante au froid et facile à cultiver. Je conviens très bien aux débutants.
- **Printemps – Été** : Placez-moi dehors, dans un endroit lumineux, au soleil ou à mi-ombre. En période de fortes chaleurs, protégez-moi du soleil brûlant de l'après-midi.
- **Hiver** : Je perds naturellement mes feuilles en automne. Je supporte très bien le froid et les gelées, mais en bonsaï, mes racines sont plus exposées. En cas de gel prolongé, protégez mon pot avec un voile d'hivernage ou un matériau isolant.



Arrosage

- **L'arrosage est essentiel à ma santé.** J'apprécie un substrat légèrement humide, mais jamais détrempé.
- **Printemps – Été** : Surveillez-moi quotidiennement et arrosez dès que la surface de mon substrat commence à sécher. En période de fortes chaleurs, un arrosage quotidien peut être nécessaire.
- Je tolère mieux les courtes périodes de sécheresse que certaines autres espèces, mais en bonsaï, ma motte ne doit pas se dessécher complètement.
- **Hiver** : Ayant perdu mes feuilles, mes besoins en eau diminuent. Surveillez simplement l'humidité de ma terre.
- Arrosez toujours l'ensemble de ma motte et assurez-vous que l'eau s'écoule correctement sous mon pot.
- Attention : pas de soucoupe ni d'eau stagnante, pour éviter le pourrissement de mes racines.



Rempotage

- Mon rempotage s'effectue au début du printemps, généralement en mars, juste avant l'ouverture de mes bourgeons.
- Rempotez-moi tous les 2 à 3 ans environ pour les jeunes sujets, et tous les 4 à 6 ans pour les spécimens plus âgés, selon le développement de mes racines.
- Utilisez un substrat drainant, capable de conserver une humidité suffisante sans retenir trop d'eau.
- Vous pouvez raccourcir mes racines les plus longues lors du rempotage, mais évitez de réduire ma motte de plus d'un tiers pour ne pas me fragiliser.
- À la pépinière, je pousse dans un mélange de tourbe noire, tourbe blonde, terre végétale, fumier de cheval et pouzzolane.

Siberian elm "*Ulmus pumila*"

Deciduous / Outdoor bonsai



To develop my full potential, I need :



Pruning

- I am a vigorous tree that grows rapidly, producing many new shoots from spring through the end of summer.
- You can perform an initial pruning in the spring, and then prune again during the summer, depending on how much I have grown.
- Once my new shoots have developed sufficiently, trim them back to two or three leaves to encourage branching.
- Structural pruning is best carried out in late winter, before the growing season begins.
- Remove any poorly positioned branches or unnecessary shoots to maintain a harmonious shape.



Fertilization

- I need fertilizer about every two months, from spring through autumn.
- At the nursery, I am fed with a universal organic-chemical blend, similar to a tomato fertilizer (NPK 12-12-17).
- You can alternate between chemical and organic fertilizers (such as horse manure) to provide me with all the nutrients I need.

For more information, scan this QR code to access the complete guide on our blog :



Location

- I am a very hardy species, native to Asia; I am exceptionally cold-resistant and easy to grow, making me an excellent choice for beginners.
- **Spring – Summer** : Place me outdoors in a bright spot, in either full sun or partial shade. During periods of intense heat, protect me from the scorching afternoon sun.
- **Winter** : I naturally shed my leaves in the autumn. While I tolerate cold and frost very well, my roots are more exposed when I am grown as a bonsai. In the event of a prolonged freeze, protect my pot using a winter cover or insulating material.



Watering

- **Watering is essential to my health.** I prefer a slightly moist substrate, but never one that is waterlogged.
- **Spring – Summer** : Check me daily and water as soon as the surface of the substrate begins to dry out. During periods of intense heat, daily watering may be necessary.
- While I tolerate short dry spells better than some other species, as a bonsai, my root ball must never dry out completely.
- **Winter** : Having lost my leaves, my water requirements decrease. Simply monitor the moisture level of the soil.
- Always water the entire root ball and ensure that water drains properly from the bottom of the pot.
- **Caution** : Do not use a saucer or allow standing water, as this can cause my roots to rot.



Repotting

- I should be repotted in early spring, generally in March, just before my buds begin to open.
- Repot me approximately every 2 to 3 years when young, and every 4 to 6 years as a more mature specimen, depending on how my roots have developed.
- Use a well-draining substrate—one that can retain sufficient moisture without holding onto too much water.
- You may trim back my longest roots during repotting, but be careful not to reduce the root ball by more than a third, as this could weaken me.
- At the nursery, I am grown in a blend of black peat, light peat, topsoil, horse manure, and volcanic rock (pozzolan).